



Secretaria de Estado da Saúde – SESAU
Secretaria Executiva de Ações de Saúde – SEAS
Superintendência de Vigilância em Saúde – SUVISA

Nota Informativa SUVISA nº 15/2022

03 de março de 2022

Gerência de Vigilância e Controle de Doenças Transmissíveis – GVCDT
Assessoria Técnica de Doenças Imunopreveníveis e Vacinação – ATI

Assunto: Recomendações sobre mudanças no esquema vacinal para pessoas a partir de 12 anos de idade na Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19.

1. ATUALIZAÇÕES

O avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil permitiu a redução considerável de casos graves e óbitos pela COVID-19. À medida que a campanha de vacinação é ampliada para diferentes faixas etárias, mudanças nas estratégias e esquemas vacinais são necessários a fim de obtermos os melhores resultados de efetividade contra a doença incluindo as populações especiais.

As atualizações científicas, no momento, reforçam a capacidade das diferentes vacinas Covid-19 em induzir boa resposta imunológica, bem como de amplificar a resposta imune com dose de reforço ao esquema de vacinação primário na população geral.

Sendo assim, a adoção de esquemas específicos e reforços diferenciados têm se tornando uma boa estratégia para garantir maior proteção aos imunossuprimidos em diversos países.

Nesse contexto cabe esclarecer que, de acordo com a 12ª edição do PNO, entende-se por pessoas com alto grau de imunossupressão (imunocomprometidos):

- I - Imunodeficiência primária grave.
- II - Quimioterapia para câncer.
- III - Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras.
- IV - Pessoas vivendo com HIV/AIDS.
- V - Uso de corticoides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥ 14 dias.
- VI - Uso de drogas modificadoras da resposta imune.
- VII - Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias.
- VIII - Pacientes em hemodiálise.
- IX - Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

2. RECOMENDAÇÕES

Considerando a possibilidade de amplificação da resposta imune com doses adicionais de vacinas Covid-19 e a necessidade de adequação do esquema vacinal nos imunocomprometidos devido à redução da efetividade das vacinas após certo tempo da administração, o Ministério da Saúde, por meio da NOTA TÉCNICA Nº 11/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS¹, passa a adotar

¹ FONTE: NOTA TÉCNICA Nº 11/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS.

os seguintes esquemas expostos abaixo:

➔ **PARA A POPULAÇÃO A PARTIR DE 18 ANOS:**

Quadro 1. Esquema de vacinação para indivíduos a partir de 18 anos, não gestantes ou puérperas.

Vacina	Esquema Primário	Intervalo - D1 para D2	Reforço (REF)	
			Intervalo	Imunizante
CoronaVac	Dose 1 (D1) e Dose 2 (D2)	4 semanas (28 dias) após D1	4 meses (120 dias) após D2	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer
AstraZeneca	Dose 1 (D1) e Dose 2 (D2)	8 semanas (56 dias) após D1	4 meses (120 dias) após D2	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer
Pfizer	Dose 1 (D1) e Dose 2 (D2)	8 semanas (56 dias) após D1	4 meses (120 dias) após D2	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer
Janssen	Dose (D)	Não se aplica	2 meses (60 dias) após D2	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer

Quadro 2. Esquema de vacinação para indivíduos a partir de 18 anos, gestantes ou puérperas.

Vacina	Esquema Primário	Intervalo D1 para D2	Reforço (REF)	
			Intervalo	Imunizante
CoronaVac	Dose 1 (D1) e Dose 2 (D2)	4 semanas (28 dias) após D1	4 meses (120 dias) após D2	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar CoronaVac
Pfizer	Dose 1 (D1) e Dose 2 (D2)	8 semanas (56 dias) após D1	4 meses (120 dias) após D2	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar CoronaVac

Quadro 3. Esquema de vacinação para indivíduos **imunocomprometidos** a partir de 18 anos, **não** gestantes ou puérperas.

D1	D2	Dose Adicional (DA)		Reforço (REF)	
		Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
CoronaVac	4 semanas (28 dias) após a D1	8 semanas (56 dias) após a D2	Mesmo imunizante do esquema primário	4 meses (120 dias) após a dose adicional	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer
AstraZeneca	8 semanas (56 dias) após a D1	8 semanas (56 dias) após a D2			
Pfizer	8 semanas (56 dias) após a D1	8 semanas (56 dias) após a D2			
Janssen					
Dose (D)	D2	Dose Adicional (DA)		Reforço (REF)	
Janssen	Não recomendada	8 semanas (56 dias) após a D		4 meses (120 dias) após a DA	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer

Quadro 4. Esquema de vacinação para indivíduos **imunocomprometidos** a partir de 18 anos, gestantes ou puérperas.

D1	D2	Dose Adicional (DA)		Reforço (REF)	
		Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
CoronaVac	4 semanas (28 dias) após a D1	8 semanas (56 dias) após a D2	Mesmo imunizante do esquema primário	4 meses (120 dias) após a DA	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar CoronaVac
Pfizer	8 semanas (56 dias) após a D1	8 semanas (56 dias) após a D2			

➔ **PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS:**

Quadro 5. Esquema de vacinação para adolescentes entre 12 e 17 anos, **não** gestantes ou puérperas.

Vacina	Esquema primário	Intervalo	Dose Adicional (DA)	Reforço (REF)
Pfizer	Dose 1 (D1) e Dose 2 (D2)	8 semanas (56 dias) após D1	Não indicado	Não indicado
CoronaVac	Dose 1 (D1) e Dose 2 (D2)	4 semanas (28 dias) após D1	Não indicado	Não indicado

Quadro 6. Esquema de vacinação para adolescentes entre 12 e 17 anos, gestantes ou puérperas.

Vacina	Esquema primário	Intervalo	Dose Adicional (DA)	Reforço (REF)	
				Intervalo	Imunizante
Pfizer	Dose 1 (D1) e Dose 2 (D2)	8 semanas (56 dias) após D1	Não indicado	4 meses (120 dias) após D2	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar CoronaVac
CoronaVac	Dose 1 (D1) e Dose 2 (D2)	4 semanas (28 dias) após D1	Não indicado	4 meses (120 dias) após D2	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar CoronaVac

Quadro 7. Esquema de vacinação para adolescentes imunocomprometidos entre 12 e 17 anos, **incluindo** gestantes ou puérperas.

D1	D2	Dose Adicional (DA)	Reforço (REF)	
			Intervalo	Imunizante
Pfizer	8 semanas (56 dias) após D1	8 semanas (56 dias) após a D2	4 meses (120 dias) após DA	Pfizer

Cabe destacar também que, a SECOVID/MS considera esquema completo de vacinação o indivíduo que completou o esquema D1+D2+REF ou D de Janssen + REF (após 2 meses)

PARA INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADICIONAIS CONTATAR:

• **Assessoria Técnica de Doenças Imunopreveníveis e Vacinação (ATI),**
 Fone: (82) 3315-7859,
 e-mail: pnialcovid@gmail.com